



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα,
Αριθ. πρωτ:

04.08.2026
205123

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
E-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., Γαλλίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
της εταιρείας,
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και Σια Ε.Ε.
- "AGRIBIZ"
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα
E-mail: info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14958 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SUMI ALPHA GOLD (esfenvalerate 5% β/ο), ως προς τα στοιχεία στο φάσμα δράσης και στην κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών του σκευάσματος»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
 - β) (ΕΕ) αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - γ) (ΕΕ) αριθμ. 2026/1123 της 26ης Μαΐου 2026 σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 547/2011.
3. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 144670/05.06.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 14958 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SUMI ALPHA GOLD (esfenvalerate 5% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 71109/18.03.2026 απόφαση μας, ως προς τα στοιχεία στο φάσμα δράσης και στην κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών του σκευάσματος.

Τα σημεία **5** και **17** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Μηλιά (MABSD) Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Aphis spiraecola</i> (APHISI), <i>Aphis pomi</i> (APHIPO), <i>Dysaphis plantaginea</i> (DYSAPL), <i>Dysaphis pyri</i> (DYSAPY) Καρπόκαψα των μηλοειδών <i>Cydia pomonella</i> (CARPO), <i>Psylla pyri</i> (PSYLPI)	19,8	100	Εφαρμογές από την έκπτυξη των πρώτων φύλλων έως ότου οι καρποί να πάρουν το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας (BBCH 11-85)	3/14
Ροδακινιά (PRNPS) Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Myzus persicae</i> (MYZUPE), <i>Cydia pomonella</i> (CARPPO), <i>Grapholita molesta</i> (LASPMO)	19,8	100	Εφαρμογές από την έκπτυξη των πρώτων φύλλων έως ότου οι καρποί να πάρουν το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας (BBCH 11-85)	3/14
Πατάτα (SOLTU)	Δορυφόρος της πατάτας <i>Leptinotarsa decemlineata</i> (LPTNDE)	20-30	40-50	Εφαρμογές από την έκπτυξη του 2 ^{ου} φύλλου στον κύριο βλαστό (BBCH 12) και μετά	3/14
Μηδική (MEDSA)	Φυτονόμος μηδικής <i>Hypera postica</i> (HYPRPO)	18	30-60	Εφαρμογή κατά την επιμήκυνση του κυρίου βλαστού, όταν είναι ορατό το πρώτο μεσογονάτιο διάστημα (BBCH 31) και μετά	3*/14

Ζαχαρότευτλα (BEAVA)	<i>Mamestra brassicae</i> (BARABR) <i>Myzus persicae</i> (MYZUPE) <i>Aphis fabae</i> (APHIFA)	20-30	20-40	Εφαρμόζεται από την εμφάνιση του πρώτου ζεύγους φύλλων, που δεν έχουν ακόμη ξεδιπλωθεί έως ότου ο καρπός φθάσει στο μέγεθος συγκομιδής (BBCH 11-49)	2/14
Τομάτα (LYPES)	<i>Helicoverpa armigera</i> (HELIAR)	20-30	50-120	Εφαρμόζεται από το 1 ^ο πραγματικό φύλλο στο βλαστό έως την ανάπτυξη των βλαστικών μερών του φυτού (BBCH 11- 40) και από την ολοκλήρωση ανάπτυξης των βλαστικών μερών του φυτού έως το 50% των καρπών να έχουν αποκτήσει το τυπικό χρώμα της ποικιλίας (BBCH 49-85)	3/14
Βαμβάκι (GOSSS)	<i>Aphis gossypii</i> (APHIGO) <i>Pectinophora gossypiella</i> (PECTGO) <i>Helicoverpa armigera</i> (HELIAR)	20-30	40-60	Εφαρμόζεται από την έκπτυξη του 1 ^{ου} φύλλου έως την ανάπτυξη των βλαστικών μερών του φυτού και από την ολοκλήρωση ανάπτυξης των βλαστικών μερών του φυτού έως το 90% των βολβών έχουν φθάσει στο τελικό μέγεθος (BBCH 11- 40) & (BBCH 49-79)	3/14
Αμπέλι (VITVI) (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)	Ευδεμίδα της αμπέλου <i>Lobesia botrana</i> (POLYBO) Πυραλίδα της αμπέλου <i>Eupoecilia ambiguella</i> (CLYSAM)	20-30	60-150	Έναρξη εφαρμογής με την εμφάνιση της προσβολής και ανάλογα με τις συλλήψεις των ακμαίων σε παγίδες και την εκκόλαψη των αυγών. Εφαρμογή με την εμφάνιση από την έκπτυξη του 1 ^{ου} φύλλου μακριά από τον βλαστό έως να μαλακώσουν οι καρποί (BBCH 11- 85)	2/14

Ποώδη καλλωπιστικά φυτά Τριανταφυλλιά	<i>Macrosiphum rosae</i> (MACSRO)	20-30	10-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μην εφαρμόζετε από την ανάπτυξη των βλαστικών μερών του φυτού έως την ολοκλήρωση ανάπτυξης των βλαστικών μερών του φυτού (BBCH 40-49)	3/14
--	--------------------------------------	-------	--------	--	------

Παρατηρήσεις:

*Για τη χρήση του προϊόντος στην καλλιέργεια της μηδικής να εφαρμόζονται δύο ψεκασμοί ανά κοπή (χέρι) με μεσοδιάστημα εφαρμογής 14 μέρες. Αν απαιτείται τρίτη εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί 30 ημέρες μετά τη δεύτερη εφαρμογή της προηγούμενης κοπής.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- Validation of analytical HPLC method for determination of active substance in two formulations, oil in water (EW) containing esfenvalerate.
- validation data regarding the efficiency of the extraction procedures in food stuff of animal origin.
- Τουλάχιστον 2 πειράματα φυτοτοξικότητας στη χώρα μας τα οποία να υποστηρίζουν την ασφαλή χρήση του σκευάσματος σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω ποικιλίες αχλαδιού Κρυστάλλι ή Κοντούλα.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 71109/18.03.2026 απόφασή μας.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ