



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 10.07.2026  
Αριθ. πωτ.: 182371

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα  
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά  
Τηλέφωνο: 210 9287188  
e-mail: [ktsarna@minagric.gr](mailto:ktsarna@minagric.gr)

Προς: MAGMA AGRO A.E.B.E.  
Λεωφ. Κηφισίας 55  
Μαρούσι, Τ.Κ. 15123  
e-mail: [efi.voulgari@magma-agro.gr](mailto:efi.voulgari@magma-agro.gr)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) CRINIFER 50 WG (δ.ο. flonicamid 50% β/β)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
  - β) (ΕΕ) 2023/1446 της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών .....flonicamid (φλονικαμίδη).....
  - γ) (ΕΕ) με αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 2026/1123 της 26ης Μαΐου 2026 σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 547/2011.
  - ε) (ΕΚ) με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.
  - στ) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις

ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β΄2339/14.05.2025).
4. Την αριθ. 14984 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) RADICO 50 WG (δ.ο. flonicamid 50% β/β) η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 139874/02.06.2026 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ. 169018/29.06.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **(εντομοκτόνο) CRINIFER 50 WG (δ.ο. flonicamid 50% β/β)** της εταιρείας **MAGMA AGRO Α.Ε.Β.Ε.**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

|                   |
|-------------------|
| <b>14991</b>      |
| <b>10.07.2026</b> |
| <b>30.11.2027</b> |

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:  
1.2.β Μορφή:

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>CRINIFER 50 WG</b>                   |
| Εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι <b>(WG)</b> |

**1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

|                   |
|-------------------|
| <b>flonicamid</b> |
|-------------------|

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

|               |
|---------------|
| 98% (β/β) min |
|---------------|

Χημική ομάδα:

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Πυριδινοκαρβοξαμιδίων/Pyridinecarboxamide |
|-------------------------------------------|

Παρασκευαστής της δ.ο.:

|                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Shandong United Pesticide Industry Co., Ltd.</b><br>Building 1#, Middle Shengli Road, Daxin Village, Fan Town,<br>Daiyue District, Taian City, Shandong, Κίνα |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

|                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:<br><br><b>Shandong United Pesticide Industry Co., Ltd.</b><br>Building 1#, Middle Shengli Road, Daxin Village, Fan Town,<br>Daiyue District, Taian City, Shandong, Κίνα |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως κατατέθηκαν στην αριθ. 10630/295475/01.10.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**MAGMA AGRO A.E.B.E.**

Λεωφ. Κηφισίας 55

Μαρούσι

Τ.Κ. 15123

Τηλ.: +30 211 9904 700

E-mail: [efi.voulgari@magma-agro.gr](mailto:efi.voulgari@magma-agro.gr)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**MAGMA AGRO A.E.B.E.**

Λεωφ. Κηφισίας 55

Μαρούσι

Τ.Κ. 15123

Τηλ.: +30 211 9904 700

E-mail: [efi.voulgari@magma-agro.gr](mailto:efi.voulgari@magma-agro.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**MAGMA AGRO A.E.B.E.**

Λεωφ. Κηφισίας 55

Μαρούσι

Τ.Κ. 15123

Τηλ.: +30 211 9904 700

E-mail: [efi.voulgari@magma-agro.gr](mailto:efi.voulgari@magma-agro.gr)

*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**MAGMA AGRO A.E.B.E.**

Λεωφ. Κηφισίας 55,

Μαρούσι

Τ.Κ. 15123

Τηλ.: +30 211 9904 700

E-mail: [efi.voulgari@magma-agro.gr](mailto:efi.voulgari@magma-agro.gr)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**Shandong United Pesticide Industry Co., Ltd.**

Building 1#, Middle Shengli Road, Daxin Village, Fan Town,  
Daiyue District, Taian City, Shandong, Κίνα

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**MAGMA AGRO A.E.B.E.**

Θέση Ποταμιά,

Οινόφυτα,

GR-32011, Βοιωτία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία:** flonicamid 50% β/β  
**Βοηθητικές ουσίες:** 49% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθ. 10630/295475/01.10.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

| 2 Συσκευασίες |                           |           |                       |
|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| A/A           | Είδος                     | Μέγεθος   | Υλικό                 |
| 1             | Φιάλη εντός χαρτοκυτίου   | 40-500 g  | HDPE<br>Κουτί χάρτινο |
| 2             | Σακούλα εντός χαρτοκυτίου | 40-1000 g | HDPE<br>Κουτί χάρτινο |

3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού εφαρμογής:**

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε πάλι με άφθονο νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για διαχείριση τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

**Συνδυαστικότητα:** Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό εντομοκτόνο κατά των αφίδων. Η δράση του εντοπίζεται στην εκλεκτική παρεμπόδιση της διατροφικής συμπεριφοράς των αφίδων με αποτέλεσμα τα έντομα να σταματούν αμέσως να τρέφονται και να πεθαίνουν σε 1-3 ημέρες μετά την εφαρμογή.

**5** Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής                                                                                                        | Στόχος                                                                                                                                                                                                                                           | Δόσεις σκευάσματος |                           |                                  | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής                                                       | Μεγ. Αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (σε ημέρες) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | γρ./ στρέμμα       | γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα |                                                                                   |                                                                              |
| <b>Πορτοκαλιές</b> (CIDSΙ),<br><b>Μανταρινιές</b> (CIDRE),<br><b>Λεμονιές</b> (CIDLI),<br><b>Γκρεϊπ- φρουτ</b> (CIDPA) | <b>Αφίδες</b><br><b>Εσπεριδοειδών</b><br><b><i>Aphis citricola</i></b> (APHISΙ),<br><b><i>Toxoptera auranti</i></b> (TOXOAU),<br><b><i>Aphis gossypii</i></b> (APHIGO),<br><b><i>Myzus persicae</i></b> (MYZUPE)                                 | 10                 | 3,5-10                    | 100–300                          | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών <sup>(1)</sup> | 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται                                  |
| <b>Ροδακινιές</b> (PRNPS)                                                                                              | <b>Αφίδες</b><br><i>Myzus persicae</i> (MYZUPE),<br><i>Hyalopterus pruni</i> (HYALPR),<br><i>Brachycaudus helichrysi</i> (ANURHE),<br><i>Brachycaudus schwartzi</i> (APPESW)                                                                     | 14                 | 8-14                      | 100-150                          | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών <sup>(1)</sup> | 2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται                                  |
| <b>Κερασιές</b> (PRNAV)                                                                                                | <b>Αφίδες</b><br><b><i>Myzus cerasi</i></b> (MYZUCE),<br><b><i>Myzus persicae</i></b> (MYZUPE),<br><b><i>Brachycaudus helichrysi</i></b> (ANURHE),<br><b><i>Brachycaudus schwartzi</i></b> (APPESW),<br><b><i>Hyalopterus pruni</i></b> (HYALPR) | 14                 | 8-14                      | 100-150                          | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών <sup>(1)</sup> | 2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται                                  |
| <b>Δαμασκηνιές</b> (PRNDO)                                                                                             | <b>Αφίδες</b><br><i>Hyalopterus pruni</i> (HYALPR)<br><i>Myzus persicae</i> (MYZUPE),<br><i>Brachycaudus helichrysi</i> (ANURHE),<br><i>Brachycaudus</i>                                                                                         | 14                 | 8-14                      | 100-150                          | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών <sup>(1)</sup> | 2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται                                  |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |    |      |         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | <i>schwartzi</i><br>(APPESW)                                                                                                                                                                                     |    |      |         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
| <b>Μηλιές</b><br>(MABSD)                                                                         | <b>Γκρίζα αφίδα</b><br><i>Dysaphis plantaginea</i><br>(DYSAPL),<br><i>Dysaphis pyri</i><br>(DYSAPY),<br><i>Eriosoma lanigerum</i><br>(ERISLA)<br><b>Πράσινη αφίδα</b><br><i>Aphis pomi</i><br>(APHIPO)           | 14 | 8-14 | 100-150 | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών <sup>(1)</sup>                                                                                              | 3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται                                                    |
| <b>Αχλαδιές</b><br>(PYUCO),<br><b>Κυδωνιές</b><br>(CYDOB),                                       | <b>Αφίδες, γκρίζα αφίδα της αχλαδιάς</b><br><i>Dysaphis pyri</i><br>(DYSAPY),<br><i>Eriosoma lanigerum</i><br>(ERISLA)                                                                                           | 14 | 8-14 | 100-150 | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών <sup>(1)</sup>                                                                                              | 3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται                                                    |
| <b>Τομάτες (Υ)</b><br>(LYPES),<br><b>Μελιτζάνες (Υ)</b><br>(SOLME)                               | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO),<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE),<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU),<br><i>Macrosiphum sp.</i><br>(MACSSP),<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA) | 10 | --   | 50-100  | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών <sup>(1)</sup>                                                                                              | 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται                                                    |
| <b>Τομάτες (Θ)</b><br>(LYPES),<br><b>Μελιτζάνες (Θ)</b><br>(SOLME)                               | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO),<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE),<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU),<br><i>Macrosiphum sp.</i><br>(MACSSP),<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA) | 10 | --   | 50-100  | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. <sup>(1)</sup> (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα) | 3 εφαρμογές max<br><br>(1 φυλλώματος, 2 με στάγδην άρδευση) ανά 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται |
| <b>Τομάτες (Θ)</b><br><b>(εφαρμογές με στάγδην άρδευση)</b><br>(LYPES),<br><b>Μελιτζάνες (Θ)</b> | <b>Αλευρώδεις</b><br><i>Bemisia tabaci</i><br>(BEMITA),<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>(TRIAVA)                                                                                                          | 16 | --   | 200-500 | Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στα φύλλα ενάντια στις αφίδες. Σε αυτή την                                                                                                            |                                                                                                |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |    |    |        |                                                                                                                                                                                   |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <u>(εφαρμογές με στάγδην άρδευση)</u><br>(SOLME)                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |    |    |        | περίπτωση ο αριθμός εφαρμογών είναι max 3 με δύο επεμβάσεις στάγδην άρδευση και μία φυλλώματος                                                                                    |                                             |
| <b>Αγγούρια (Θ)</b><br>(CUMSA),<br><b>Αγγουράκια (Θ)</b><br>(CUMSA),<br><b>Κολοκυθάκια (Θ)</b><br>(CUUPG) | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO),<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE),<br><i>Macrosiphum euphorbiae</i><br>(MACSEU),<br><i>Macrosiphum</i><br><i>sp.</i><br>(MACSSP),<br><i>Aphis fabae</i><br>(APHIFA)    | 10 | -- | 50-100 | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. <sup>(1)</sup><br>(ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα) | 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται |
| <b>Σιτάρι</b><br>(TRZSS)                                                                                  | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis nasturtii</i><br>(APHINA),<br><i>Macrosiphum avenae</i><br>(MACSAV)<br><i>Macrosiphum dirhodum</i><br>(MACSSP),<br><i>Metopolophium dirhodum</i><br>(METODR),<br><i>Rhopalosiphum padi</i> (RHOPPA) | 14 | -- | 20-50  | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών                                                                                                                | 2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται |
| <b>Καπνός</b><br>(NIOTA)                                                                                  | <b>Αφίδες</b><br><i>Myzus</i> sp.<br>(MYZUSP)                                                                                                                                                                                 | 14 | -- | 40-60  | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών                                                                                                                | 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                        |     |    |        |                                                                                                                                                                                          |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Βαμβάκι</b><br>(GOSHI)                                                                            | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)                                                                                                     | 7,5 | -- | 50-80  | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών <sup>(1)</sup>                                                                                                        | 2 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται  |
| <b>ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ</b> (2ORNH)<br><b>Τριανταφυλλιές</b> (ROSSS)<br><b>υπαίθρου και θερμοκηπίου</b> | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i> (APHIGO),<br><i>Myzus persicae</i> (MYZUPE),<br><i>Macrosiphum</i> sp. (MACSSP),<br><i>Aphis fabae</i> (APHIFA) | 14  | -- | 50-100 | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών - εντόμων. <sup>(1)</sup> (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα) | 3 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται |
| <b>ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ</b> (2ORNW)                                          |                                                                                                                                                        |     |    |        | Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών                                                                                                                       |                                                |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.
2. Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
3. Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών.
4. Η χρήση στην Λεμονιά (CIDLI) περιλαμβάνει και τα Κιτρολέμονα (CIDME).
5. Η χρήση στα Γκρέιπ- φρουτ (CIDPA), περιλαμβάνει και τις Φράπες (CIDGR).
6. Η χρήση στη Πορτοκαλιάς (CIDSJ), περιλαμβάνει και τις Νεραντζιές (CIDAU) και Περγαμόντο (CIDAB).
7. Η χρήση στις Αχλαδιές (PYUCO) περιλαμβάνει και τα Ασιατικά αχλάδια (Αχλαδιές NASHI) (PYUPC).

**6**

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας**

Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. flonicamid, η οποία ανήκει στην ομάδα 29 κατά IRAC.

Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται:

- Η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα.
- Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφέλιμων αρθρόποδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες.
- Επεμβάσεις με το σκεύασμα νωρίς, όταν ο πληθυσμός των αφίδων είναι σε χαμηλά επίπεδα.
- Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και να εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας.

- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το σκεύασμα.
- Επιτρέπεται η χρήση κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας (μία μόνο εφαρμογή) και κατά την περίοδο παραγωγής μελιτωμάτων (που προϋπάρχουν της εφαρμογής) σε ώρες που οι μέλισσες δεν είναι ενεργές.

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

---

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

---

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

6 ώρες στον αγρό και 8 ώρες στο θερμοκήπιο

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητική λέξη:



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

**GHS07**

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

**EU451:** Μπορεί να προκαλέσει πολύ μακροχρόνια και διάχυτη μόλυνση υδάτινων πόρων.

**EU208:** Περιέχει Disodium maleate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**EU401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις Προφύλαξης:

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P264:** Πλύνετε τα χέρια, τους βραχίονες και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γυαλιά ή μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια της ανάμειξης/φόρτωσης.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ με καμπίνα.

Φοράτε γάντια και γυαλιά ή μάσκα προσώπου εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ χωρίς καμπίνα.

Φοράτε γάντια, γυαλιά ή μάσκα προσώπου και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία εάν η εφαρμογή γίνεται με ψεκαστήρα πλάτης ή αυλό.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού ψεκασμού.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία.

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

**SPe8:** Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο παρουσίας μελισσών.

## 12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** ξεπλύνετε τις περιοχές του δέρματος στις οποίες έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό. Πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

| Φυτικά προϊόντα                                                                                                                                      | Ημέρες |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Πορτοκάλια, Νεράντζια, Περγαμόντα - 0110020<br>Μανταρίνια- 0110050<br>Λεμόνια ,Κίτρα -0110030<br>Γκρέιπ φρούτ, Φράπες - 0110010                      | 60     |
| Μήλα – 0130010,<br>Αχλάδια, Αχλάδια Nashi - 0130020<br>Κυδώνια - 0130030                                                                             | 21     |
| Ροδάκινα– 0140030<br>Δαμάσκηνα -0140040<br>Κεράσια - 0140020                                                                                         | 14     |
| Αγγούρια -0232010, Αγγουράκια -0232020,<br>Κολοκυθάκια -0232030 (θερμοκηπίου)<br>Τομάτες -0231010, Μελιτζάνες -0231030<br>(υπαίθρου και θερμοκηπίου) | 1      |
| Καπνός                                                                                                                                               | 7      |
| Σιτάρι - 0500090                                                                                                                                     | 28     |
| Βαμβάκι – 0401090                                                                                                                                    | 75     |
| Καλλωπιστικά Τριανταφυλλιές<br>Καλλωπιστικά δέντρα και καλλωπιστικοί θάμνοι                                                                          | -      |

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στην έκθεση αξιολόγησης που στηρίχτηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης του πανομοιότυπου προϊόντος οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- A shelf life study of 2 years at ambient temperature when stored in HDPE plastic material.

**B Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.**

**ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ**