



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11.08.2026
Αριθ. πρωτ.: 210951

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogiani@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα Αττικής

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 60657 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ORTIVA 25 SC (azoxystrobin 25% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με τη «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 799/12922/23.01.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60657 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ORTIVA 25 SC (azoxystrobin 25% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 92804/15.04.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε τη με αριθ. 60657 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ORTIVA 25 SC (azoxystrobin 25% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 799/12922/23.01.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Αγκινάρα CYUSC	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA	80	--	50-125	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 5 ^{ου} φύλλου έως την εμφάνιση της ανθοταξίας (κεφαλής) BBCH 15-55	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Σπαράγγι ASPSS	Σκωρίαση <i>Puccinia asparagi</i> PUCCAS Στεμφύλιο <i>Stemphylium</i> sp. STEMSP	80	--	30-100	Ψεκασμοί φυλλώματος Όταν σταματήσει να αναπτύσσεται ο μακρύτερος βλαστός έως το τέλος της ανάπτυξης των καρπών BBCH 41-89	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου) SOLME	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA <i>Oidium</i> sp. OIDISP	80	80	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 16-89	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
	Αλτερνάρια <i>Alternaria solani</i> ALTESO Περονόσπορος <i>Phytophthora infestans</i> PHYTIN	100	80-100			
Πιπεριές (Υπαίθρου και θερμοκηπίου) CPSAN	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA <i>Oidium</i> sp. OIDISP Αλτερνάρια <i>Alternaria solani</i> ALTESO	80	80	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 16-89	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται

Τομάτα (Θερμοκηπίου) LYPES	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA <i>Oidium</i> sp. OIDISP	80	80	40-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 16-89	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
	Αλτερνάρια <i>Alternaria solani</i> ALTESO Περονόσπορος <i>Phytophthora infestans</i> PHYTIN	100	80-100			
Μπρόκολο BXHSS	Περονόσπορος <i>Hyaloperonospora parasitica</i> PEROPA Αλτερνάρια <i>Alternaria brassicae</i> ALTEBA	80-100	--	20-60	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή BBCH 16-49	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 12 ημέρες εφόσον απαιτείται
Κουνουπίδι BR SOB	Αλτερνάρια <i>Alternaria brassicae</i> ALTEBA Περονόσπορος <i>Hyaloperonospora parasitica</i> PEROPA	80-100	--	20-60	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή BBCH 16-49	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 12 ημέρες εφόσον απαιτείται
Κολοκυθάκια (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) CUUPG	Κλαδοσπορίωση <i>Cladosporium cucumerinum</i> CLADCU Περονόσπορος <i>Pseudoperonospora cubensis</i> PSPECU	100	80-100	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται

	Ωίδιο <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU	80	60-80		πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 16-89	
Αγγούρι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) CUMSA	Κλαδοσπορίωση <i>Cladosporium cucumerinum</i> CLADCU Περονόσπορος <i>Pseudoperonospora cubensis</i> PSPECU	100	80-100	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 16-89	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
	Ωίδιο <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU	80	60-80			
Πεπόνι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) CUMME	Κλαδοσπορίωση <i>Cladosporium cucumerinum</i> CLADCU Περονόσπορος <i>Pseudoperonospora cubensis</i> PSPECU	100	80-100	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 16-89	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
	Ωίδιο <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU	80	60-80			

Καρπούζι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) CITLA	Κλαδοσπορίωση <i>Cladosporium cucumerinum</i> CLADCU Περονόσπορος <i>Pseudoperonospora cubensis</i> PSPECU Ωίδιο <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU	80	80	50-120	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 16-89	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Κολοκύθα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) CUUPM	Κλαδοσπορίωση <i>Cladosporium cucumerinum</i> CLADCU Περονόσπορος <i>Pseudoperonospora cubensis</i> PSPECU Ωίδιο <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU	80	80	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 16-89	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Σκόρδο ALLSA	Σκωρίαση <i>Puccinia allii</i> PUCCAL Περονόσπορος <i>Peronospora destructor</i> PERODE	80	--	20-50	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4 ^{ου} φύλλου έως το στάδιο όπου τα φύλλα του 50% των φυτών έχουν πλαγιάσει BBCH 14-48	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
Κρεμμύδια (ξηρά) ALLCE	Περονόσπορος <i>Peronospora destructor</i> PERODE	80	--	20-50	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται

					του 4 ^{ου} φύλλου έως το στάδιο όπου τα φύλλα του 50% των φυτών έχουν πλαγιάσει BBCH 14-48	
Φασόλια (με και χωρίς λοβό) PHSVX	Σκωρίαση <i>Uromyces</i> sp. UROMSP Ασκοχύτωση <i>Ascochyta pisi</i> ASCOPI	80-100	--	15-80	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 7 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την έναρξη σχηματισμού λοβών BBCH 17-72	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Μπιζέλια ξηρά PEASC	Σκωρίαση <i>Uromyces</i> sp. UROMSP Ασκοχύτωση <i>Ascochyta pisi</i> ASCOPI	80-100	--	20-50	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 7 ^{ου} φύλλου/έλικα έως ότου το 20% των λοβών έχουν φθάσει το τυπικό τους μέγεθος BBCH 17-72	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Ρύζι ORYSA	Πυρρικουλάρια <i>Pyricularia oryzae</i> PYRIOR Ελμινθοσπόρια <i>Helminthosporium oryzae</i> COCHMI	100	--	20-40	Ψεκασμοί φυλλώματος. Από την έναρξη της έκπτυξης του φύλλου σημαίας έως την έναρξη της άνθησης BBCH 45-61	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται από την έναρξη της έκπτυξης του φύλλου σημαίας έως την έναρξη της έκπτυξης της ταξιανθίας BBCH 45-51, και η δεύτερη εφαρμογή εάν κρίνεται απαραίτητη από το στάδιο όπου το 70% της ταξιανθίας έχει

						εμφανισθεί έως και την έναρξη της άνθησης BBCH 57-61
Φράουλες (Υπαίθρου και θερμοκηπίου) FRAAN	Ωίδιο <i>Podosphaera macularis</i> SPHRMA	80	--	50-80	Ψεκασμοί φυλλώματος. Από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως τη δεύτερη συγκομιδή που οι περισσότεροι καρποί έχουν λάβει το τυπικό χρώμα BBCH 51-89	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
Σιτάρι TRZSS	Σεπτορίωση <i>Septoria tritici</i> SEPTTR Σκωρίαση <i>Puccinia triticina</i> PUCCRT	60-100	--	20-30	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους έως το τέλος της άνθησης BBCH 30-69	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Βρώμη AVESA	Σεπτορίωση <i>Septoria tritici</i> SEPTTR Σκωρίαση <i>Puccinia triticina</i> PUCCRT	60-100	--	20-30	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους έως την πλήρη έκπτυξη του στάχewς BBCH 30-59	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Σίκαλη SECCE	Σεπτορίωση <i>Septoria tritici</i> SEPTTR Σκωρίαση <i>Puccinia triticina</i> PUCCRT	60-100	--	20-30	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους έως το τέλος της άνθησης BBCH 30-69	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται

Κριθάρι HORVX	Σεπτορίωση <i>Septoria tritici</i> SEPTTR Σκωρίαση <i>Puccinia triticina</i> PUCCRT	60-100	--	20-30	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους έως την πλήρη έκπτυξη του στάχew BBCH 30-59	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Πράσο ALLPO	Περονόσπορος <i>Peronospora</i> <i>destructor</i> PERODE	80	--	20-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} φύλλου έως το στάδιο όπου τα φύλλα του 50% των φυτών έχουν πλαγιάσει BBCH 16-48	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 12 ημέρες εφόσον απαιτείται
Κρεμμύδια (χλωρά) ALLCE	Περονόσπορος <i>Peronospora</i> <i>destructor</i> PERODE	80	--	20-50	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4 ^{ου} φύλλου έως το στάδιο όπου τα φύλλα του 50% των φυτών έχουν πλαγιάσει BBCH 14-48	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Λάχανο BRSOL Λαχανάκια Βρυξελλών BRSOF	Αλτερνάρια <i>Alternaria brassicae</i> ALTEBA	80-100	--	20-60	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή και κλείσει BBCH 16-49	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 12 ημέρες εφόσον απαιτείται

Κάλε (λαχανίδα) BRSOA Κινέζικο λάχανο BRSPK	Αλτερνάρια <i>Alternaria brassicae</i> ALTEBA Περονόσπορος <i>Hyaloperonospora parasitica</i> PEROPA	80-100	--	20-60	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή BBCH 16-49	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 12 ημέρες εφόσον απαιτείται
Ρέβα BRSTR	Αλτερνάρια <i>Alternaria brassicae</i> ALTEBA	80-100	--	20-60	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή BBCH 16-49	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καρότο DAUCS	Ωίδιο <i>Erysiphe</i> sp. ERYSSP Αλτερνάρια <i>Alternaria dauci</i> ALTEDA Σεπτορίωση <i>Septoria apiicola</i> SEPTAP	80-100	--	20-60	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου η ρίζα φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή BBCH 16-49	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
Σελινόριζα APUGR	Αλτερνάρια <i>Alternaria dauci</i> ALTEDA Σεπτορίωση <i>Septoria apiicola</i> SEPTAP	100	--	20-60	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου η ρίζα φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή BBCH 16-49	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται

Σέλερυ APUGD	Αλτερνάρια <i>Alternaria dauci</i> ALTEDA Σεπτορίωση <i>Septoria apiicola</i> SEPTAP	100	--	20-60	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου το φύλλωμα φθάσει στο τυπικό του μέγεθος και μορφή BBCH 16-49	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Φινόκιο (Μαραθόριζα) FOEVA	Αλτερνάρια <i>Alternaria dauci</i> ALTEDA Σεπτορίωση <i>Septoria apiicola</i> SEPTAP	100	--	20-60	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου το φύλλωμα φθάσει στο τυπικό του μέγεθος και μορφή BBCH 16-49	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Ραπανάκι RAPSR	Αλτερνάρια <i>Alternaria dauci</i> ALTEDA Σεπτορίωση <i>Septoria apiicola</i> SEPTAP	80-100	--	20-60	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου η ρίζα φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή BBCH 16-49	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Μαϊντανός PARCR	Αλτερνάρια <i>Alternaria dauci</i> ALTEDA Σεπτορίωση <i>Septoria apiicola</i> SEPTAP	100	--	20-60	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου το φύλλωμα φθάσει στο τυπικό του μέγεθος και μορφή BBCH 16-49	Μέχρι 2-3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται

Φασόλια (ξηρά) PHSVX	Σκωρίαση <i>Uromyces</i> sp. UROMSP Ασκοχύτωση <i>Ascochyta pisi</i> ASCOPI	80-100	--	20-50	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 7 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου το 20% των λοβών έχουν φθάσει το τυπικό τους μέγεθος BBCH 17-72	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Φακές LENCU	Σκωρίαση <i>Uromyces</i> sp. UROMSP Ασκοχύτωση <i>Ascochyta pisi</i> ASCOPI	80-100	--	20-50	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 7 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου το 20% των λοβών έχουν φθάσει το τυπικό τους μέγεθος BBCH 17-72	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Μπιζέλια, αρακάς με και χωρίς λοβό PIBSX	Σκωρίαση <i>Uromyces</i> sp. UROMSP Ασκοχύτωση <i>Ascochyta pisi</i> ASCOPI	80-100	--	20-50	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων έως το τέλος της άνθησης BBCH 51-69	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Μαρούλι (Υπαίθρου και θερμοκηπίου) ¹ LACSA Λυκοτρίβολο VLLLO	Περονόσπορος <i>Bremia lactucae</i> BREMLA	100	--	30-120	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή BBCH 14-49	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται

Αντίδι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) CICEN	Περονόσπορος <i>Bremia lactucae</i> BREMLA	100	--	30-120	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή και κλείσει BBCH 14-49	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
Ρόκα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) ERUVE	Περονόσπορος <i>Bremia lactucae</i> BREMLA	100	--	30-120	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή BBCH 14-49	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
Αραβόσιτος (για ενσίρωση και για παραγωγή σπόρων) ZEAMX	<i>Setosphaeria turcica</i> SETOTU	100	--	20-30	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της άνθησης (BBCH 61) και 21 ημέρες μετά	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
Αρωματικά φυτά Βασιλικός OCIBA Κόλιανδρος CORSΑ Ρίγανη ORIVU Θυμάρι THYME Μέντα MENSS Δυόσμος MENSP Σχοινόπρασο ALLSC Μυρώνι ANRCE (Υπαίθρου και	Περονόσπορος <i>Bremia lactucae</i> BREMLA Αλτερνάρια <i>Alternaria dauci</i> ALTEDA	100	--	20-60	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου το προς συγκομιδή μέρος φθάσει στο τυπικό του μέγεθος BBCH 14-49	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται

Θερμοκηπίου)						
Πατάτα SOLTU (γραμμική εφαρμογή)	Ριζοκτόνια <i>Rhizoctonia solani</i> RHIZSO	300	--	5-15	Ενσωμάτωση στο έδαφος πριν τη φύτευση ή κατά τη μεταφύτευση	1 εφαρμογή
Καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι* NNNZZ Χρήση Ήσσονος Σημασίας	<i>Oidium</i> sp. OIDISP Pucciniaceae 1PUCCF	100	80-100	40-100	ψεκασμός από την Άνοιξη ως το Φθινόπωρο	3
Καπνός* NIOTA Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Περονόσπορος <i>Peronospora</i> sp. PEROSP <i>Peronospora</i> <i>hyoscyami</i> PEROTA Ωίδιο <i>Golovinomyces</i> <i>cichoracearum</i> ERYSCI <i>Erysiphe</i> <i>cichoracearum</i> ERYSCI	100	--	30-90	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικούς ψεκασμούς κατά την περίοδο της ανάπτυξης φυλλώματος έως την άνθιση BBCH 33-51	2/ 7 ημέρες
Φύλλα σέλινου* (Υ/Θ) APUGS Φύλλα άνηθου* (Υ/Θ) AFEGR Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας	Περονόσπορος <i>Bremia lactucae</i> BREMLA	100	--	30-120	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή BBCH 14-49	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
Σπανάκι* (Υ/Θ) SPQOL Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Περονόσπορος <i>Bremia lactucae</i> BREMLA	100	--	30-120	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή BBCH 14-49	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται

Μπάμια* (Υ/Θ) ABMES Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA <i>Oidium</i> sp. OIDISP Αλτερνάρια <i>Alternaria solani</i> ALTESO	80	80	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 6 ^{ου} φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 16-89	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβ ανομένων ειδών κράμβης)* (Υ/Θ) Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Περονόσπορος <i>Bremia lactucae</i> BREMLA	100	--	30-120	Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από το 4 ^ο έως το 8 ^ο πραγματικό φύλλο BBCH 14-18	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στην καλλιέργεια του μαρουλιού αναφέρεται στις ακόλουθες δευτερεύουσες χρήσεις σύμφωνα με την ΥΑ 7807/207777/05.08.2021: Κατσαρά μαρούλια, Μαρούλια σαλάτες, Κεφαλωτά μαρούλια, Κοινά μαρούλια.

* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες των καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων, του καπνού, των φύλλων σέλινου, των φύλλων άνηθου, του σπανακιού, της μπάμιας **και των καλλιεργειών νεαρών φύλλων** από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια/Προϊόν (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Αγκινάρα (0270050) Μαρούλι: Κατσαρά μαρούλια, Μαρούλια σαλάτες, Κεφαλωτά μαρούλια, Κοινά μαρούλια (Υ) (0251020) Κρεμμύδια (χλωρά) (0220040) Αντίδι (Υ) (0251030), Ρόκα (Υ) (0251060) Αρωματικά φυτά (Υ) (0256000) Λυκοτρίβολο (Υ) (0251010) Φύλλα σέλινου, Φύλλα άνηθου (Υ/Θ) (0256030) Σπανάκι (Υ/Θ) (0252010) Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (Υ) (0251080)	7
Μπρόκολο (0241010), Κουνουπίδι (0241020) Σκόρδο (0220010), Κρεμμύδια (ξηρά) (0220020) Φασόλι (με και χωρίς λοβό) (0260010, 0260020) Μπιζέλι (με και χωρίς λοβό) (0260030, 0260040) Καρότο (0213020), Λάχανο (0242020)	14

Λαχανάκια Βρυξελλών (0242010) Κάλε (λαχανίδα) (0243020) Κινέζικο λάχανο (0243010), Ρέβα (0213110) Ραπανάκι (0213080), Σελινόριζα (0213030) Σέλερυ (0270030), Φινόκιο (Μαραθόριζα) (0270040) Μαρούλι: Κατσαρά μαρούλια, Μαρούλια σαλάτες, Κεφαλωτά μαρούλια, Κοινά μαρούλια (Θ) (0251020) Μαϊντανός (0256040), Αντίδι (Θ) (0251030) Αρωματικά φυτά (Θ) (0256000) Λυκοτρίβολο (Θ) (0251010), Ρόκα (Θ) (0251060), Καπνός Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (Θ) (0251080)	
Κολοκυθάκια (Υ/Θ) (0232030) Κολοκύθα (Υ/Θ) (0233020) Αγγούρι (Υ/Θ) (0232010) Πεπόνι (Υ/Θ) (0233010) Καρπούζι (Υ/Θ) (0233030) Πυτεριές (Υ/Θ) (0231020) Τομάτα (Θ) (0231010) Μελιτζάνα (Θ) (0231030) Φράουλες (Υ/Θ) (0632010) Μπάμια (Υ/Θ) (0231040)	3
Πράσο (0270060)	21
Μπιζέλια (ξηρά) (0300030) Φασόλια (ξηρά) (0300010) Φακές (0300020), Σιτάρι (0500090) Κριθάρι (0500010), Βρώμη (0500050), Σίκαλη (0500070)	1
Ρύζι (0500060)	28
Σπαράγγι (0270010), Αραβόσιτος (0500030) Πατάτα (0211000), Καλλωπιστικά δένδρα και θάμνοι	--

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 799/12922/23.01.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ