



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 04.08.2026
Αριθ. πρωτ.: 210219

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: Albaugh TKI d.o.o, Σλοβενίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - AGRIBIZ
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 70639 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) FLAPS (δ.ο. flazasulfuron 25% β/β) ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
3. Την αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).
4. Την αριθ. 182202/10.07.2026 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 70639 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) FLAPS (δ.ο. flazasulfuron 25% β/β).
5. Την αριθ. 70246 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) MINSK (flazasulfuron 25% β/β), η οποία ανανεώθηκε με την αριθ. 81040/31.03.2026 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την αριθ. 197136/24.07.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθ. **70639** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **FLAPS (δ.ο. flazasulfuron 25% β/β)**, που χορηγήθηκε με την αριθ. 182202/10.07.2026

απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **5, 11 και 13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ. περίοδο
		Γραμ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Λεμονιά CIDLI, Μανταρινιά CIDRE, Πορτοκαλιά CIDSΙ Γκρέιπ Φρουτ CIDPA	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια Πολυετή ζιζάνια *	16	20 – 40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης ή τοπικά, καλύπτοντας επιφάνεια έως το 1/3 της συνολικής έκτασης του αγρού. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, την άνοιξη – καλοκαίρι (Απρίλιος – Αύγουστος).	1
Ελιά OLVEU	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια Πολυετή ζιζάνια *	16	20 – 40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός στην γραμμή φύτευσης ή τοπικά, καλύπτοντας επιφάνεια έως το 1/3 της συνολικής έκτασης του αγρού. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το φθινόπωρο έως και την άνοιξη (Οκτώβριος- Μάρτιο).	1
Αμπέλι VITVI	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια Πολυετή ζιζάνια *	16	10 – 40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός στην γραμμή φύτευσης ή τοπικά, καλύπτοντας επιφάνεια έως το 1/3 της συνολικής έκτασης του αγρού. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, στο τέλος του χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης (Φεβρουάριος- Απρίλιος).	1

Αμυγδαλιά PRNDU Καρυδιά IUGRE Φουντουκιά CYLAV	Ετήσια Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια Πολυετή ζιζάνια*	16	20 – 40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός στην γραμμή φύτευσης, καλύπτοντας επιφάνεια έως το 1/3 της συνολικής έκτασης του αγρού. Εφαρμόζεται τέλος χειμώνα-άνοιξη, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων (Φεβρουάριος- Απρίλιος)	1
Ακαλλιέργητες εκτάσεις (Σιδηρόδρομοι, βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, νεκροταφεία, πλατείες, πλάι σε δρόμους και εθνικοί οδοί, σε χώροι με φωτοβολταϊκά πάνελ, σε αστικές και αγροτικές περιοχές).	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια Πολυετή ζιζάνια*	20	10 – 40	Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων.	1

Παρατηρήσεις:

1. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με προφυτρωτικές εφαρμογές.
2. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα μέχρι το στάδιο των 4 φύλλων ή έως τα 10 εκ ύψος (BBCH 14).
3. Μην ψεκάσετε όταν φυσάει. Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού νέφους σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
4. Η χρήση στη Μανταρινιά (CIDRE) περιλαμβάνονται και τις Κλημεντίνες (CIDCL)
5. Η χρήση στη Λεμονιά (CIDLI) περιλαμβάνονται και τα Κίτρα (CIDME)

***Καταπολεμούμενα Ζιζάνια για Εσπεριδοειδή, Ελιά, Αμπέλι και Ακαλλιέργητες εκτάσεις:**

Ευαίσθητα ζιζάνια

Αγρωστώδη:

Avena fatua - AVEFA (Αγριοβρώμη)*Bromus sterilis* - BROST (αγριοβρώμη)*Echinochloa crus-galli* - ECHCG (Μουχρίτσα)*Lolium spp*- LOLSS (Ηρα)*Poa annua* - POAAN (πόα)*Setaria verticillata* - SETVE, *S. viridis* - SETVI, *S. pumila* - SETPU (Σετάριες)

Πλατύφυλλα:

Amaranthus retroflexus - AMARE (Βλήτο)*Calendula arvensis* – CLDAR (Καλεντούλα)

Capsella bursa-pastoris - CAPBP (Καψέλλα)
Chenopodium album - CHEAL (Λουβουδιά)
Conyza (Erigeron) canadensis - ERICA (Κόνυζα)
Daucus carota – DAUCA (Αγριοκαρότο)
Diplotaxis erucoides - DIPER (Άγρια ρόκα)
Fumaria spp.- FUMOF (Καπνόχορτο)
Geranium dissectum - GERDI *G. rotundifolium* - GERRT (Γεράνι)
Lamium sp. - LAMSS (Λάμιο)
Malva sp – MALSS (Μολόχα)
Portulaca oleracea - POROL (Αντράκλα)
Senecio vulgaris– SENVU (Μαρτιάκος)
Stellaria media - STEME (Στελλάρια)
Solanum nigrum – SOLNI (Στύφνος)
Taraxacum officinale - TAROF (Αγριοραδίκι)
Trifolium spp - TRFSS (Τριφύλλι)
Urtica spp.- URTSS (Τσουκνίδα)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια

Convolvulus arvensis – CONAR (Περιπλοκάδα)
Cyperus spp. - CYPSS – (Κύπερη)
Euphorbia spp – EPHSS (Γαλατσίδα)
Sonchus arvensis - SONAR, *S. oleraceus* - SONOL (Ζωχοί)
Veronica persica – VERPE (Βερόνικα)

***Καταπολεμούμενα Ζιζάνια για Αμυγδαλιά, Φουντουκιά και Καρυδιά:**

Προφυτρωτική εφαρμογή:

Ευαίσθητα ζιζάνια
Amaranthus blitoides _AMABL (Βλήτο πλαγιαστό)
Capsella bursa-pastoris - CAPBP (Καψέλλα)
Chenopodium album - CHEAL (Λουβουδιά)
Cyperus rotundus - CYPRO (Κάπουρος)
Diplotaxis erucoides - DIPER (Άγρια ρόκα)
Euphorbia serpens – EPHSN (Ευφόρβια)
Erigeron bonariensis – ERIBO
Hordeum murinum – HORMU (Αγριοκρίθαρο)
Poa annua - POAAN (πόα)
Portulaca oleracea - POROL (Αντράκλα)
Stellaria media - STEME (Στελλάρια)

Μεταφυτρωτική εφαρμογή:

Ευαίσθητα ζιζάνια
Capsella bursa-pastoris - CAPBP (Καψέλλα)
Hordeum murinum – HORMU (Αγριοκρίθαρο)
Poa annua - POAAN (Πόα)
Stellaria media - STEME (Στελλάρια)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια

Convolvulus arvensis – CONAR (Περιπλοκάδα)
Taraxacum officinale – TAROF (Αγριοραδίκι / Ταραξάκο)

11 Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 P270: Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
 P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPE3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:

- Αμπέλι: Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων
- Εσπεριδοειδή: Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων,
- Ελιά: Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων,
- Ακαλλιέργητες εκτάσεις: Μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων
- **Αμυγδαλιά, φουντουκιά και καρυδιά: Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων**

SPE3: Σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Αμπέλι (0151010, 0151020)	75
Λεμονιά - Κιτρολέμονα (0110030), Μανταρινιά, Κλημεντίνες (0110050), Πορτοκαλιά (0110020), Γκρεϊπφρουτ (0110010)	45
Ελιά (0161030, 0402010)	45
Καρυδιά (0120110), Φουντουκιά (0120060), Αμυγδαλιά (0120010)	Ορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής
Ακαλλιέργητες εκτάσεις	Δεν ορίζεται

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 182202/10.07.2026 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ