



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 22.09.2026
Αριθ. πρωτ.: 243073

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Ξεφτέρη/Λ. Απόχα
Τηλέφωνο: 210 9287247/210 9287247
e-mail: dxeferi@minagric.gr/
lapocha@minagric.gr

Προς: Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Ιρλανδίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας
Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - "AGRIBIZ"
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
e-mail: info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ARBITER [δ.ο. fluroxypyr (methylheptyl ester) 20% β/ο]»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
 - β) (ΕΕ) 2024/2781 της επιτροπής της 31^{ης} Οκτωβρίου 2024 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών**fluroxypyr**.....
 - γ) (ΕΕ) με αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2026/1123 της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2026 σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 547/2011.
 - ε) (ΕΚ) με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την

τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.

στ) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β'2339/14.05.2025).
4. Την αριθ. 70373 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) HURLER 200 [δ.ο. fluroxypyr (methylheptyl ester) 20 % β/ο], η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 11753/280436π.ε./20.01.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ. 217912/25.08.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **ARBITER [δ.ο. fluroxypyr (methylheptyl ester) 20 % β/ο]** της εταιρείας **Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Ιρλανδίας**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

70646
22.09.2026
15.02.2028

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
1.2.β Μορφή:

ARBITER
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

fluroxypyr

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97,5 % β/β min

Χημική ομάδα:

Πυριδυλοξυοξικού οξέος

Παρασκευαστής της δ.ο.:

1) Shandong Luba Chemical Co., Ltd.

No. 26 South Xizhou Road, Licheng District, Jinan, Κίνα

2) Lier Chemical Co. Ltd.

Economic and Technical Development Zone, Mianyang, Sichuan 621000, Κίνα

3) Hunan Bidechem International Co., Ltd.

D-502, Zhongying Square, No. 368 South Xiaoxiang Road, Yuelu, Changsha 410006, Hunan, Κίνα

4) Parijat Industries (India) Pvt. Ltd.

M-77, M-Block Market, Greater Kailash-II, New Delhi, 110048, Ινδία

Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη:

Leeds Lifescience Limited

2nd Floor, Solar house, 915 High Road, London N12 8QJ, Ηνωμένο Βασίλειο

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1) Shandong Luba Chemical Co., Ltd.

No. 26 South Xizhou Road, Licheng District, Jinan, Κίνα

2) Lier Chemical Co. Ltd.

Economic and Technical Development Zone, Mianyang, Sichuan 621000, Κίνα

3) Hunan Bide Biochemical Technology Co., Ltd

Ruxi Chemical Industry Zone, Linxiang, Yueyang 414300, Hunan, Κίνα

4) Parijat Industries (India) Pvt. Ltd.

Village Khera Gani, Near Village Fatehgarh
Raipur Rani Road, District Ambala
Haryana, Ινδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως κατατέθηκαν με το με αριθμ. πρωτ. 12749/305487/26.11.2019 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. πρωτ. 4550/128266/13.05.2022, 4706/122001/25.04.2023 και 7638/197809/08.07.2024 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Barclay Chemicals (R&D) Ltd

Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart,
Dublin 15, Ιρλανδία
Τηλ.: +353 1 811 2900
Fax: +353 1 822 4678
e-mail: info@barclay.ie

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - "AGRIBIZ"
 Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
 Τηλ.: 210 7471000
 e-mail: info@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

AXIVEN-M AGRO A.E.
 Χειμάρας 3 , ΤΚ 14343 Νεα Χαλκηδόνα
 Τηλ: 210 20 27 960
 Fax: 210 20 16 199
 e-mail: agro@axiven.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.
 Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart,
 Dublin 15, Ιρλανδία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.**
 Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart,
 Dublin 15, Ιρλανδία
- 2. Alchimex**
 Heresti, jud. Giurgiu, Ρουμανία
- 3. Phyteurop**
 Zone Industrielle de Grande Champagne, 49260 Montreuil-Bailey, Γαλλία
- 4. Solfotecnica**
 Evangelista Torricelli 2, 48010 Cotignola RA, Ιταλία
- 5. Schirm GmbH**
 Mecklenburger Straße 229, 23568 Lübeck, Γερμανία
- 6. Torre Factory**
 Torre S.r.l. Via Pian d'Asso, 53024 Torrenieri - Montalcino (SI), Ιταλία
- 7. Kwizda Agro GmbH**
 A-2100 Leobendorf, Laaer Strasse/Kwizda Allee 1, Αυστρία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του
σκευάσματος:

- 8. Chemark Kft**
Peremarton gyartelep, PO Box 31, 8182, Ουγγαρία
- 9. Nufarm GmbH & Co KG**
St Peter Strasse 25, A-4021, Linz, Αυστρία
- 10.Nufarm S.A.S.**
Notre Dame De La Garenne, 27600 Gaillon, Γαλλία

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.**
Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart,
Dublin 15, Ιρλανδία
- 2. Alchimex**
Heresti, jud. Giurgiu, Ρουμανία
- 3. Phyteurop**
Zone Industrielle de Grande Champagne, 49260 Montreuil-
Bailey, Γαλλία
- 4. Solfotecnica**
Evangelista Torricelli 2, 48010 Cotignola RA, Ιταλία
- 5. Schirm GmbH**
Mecklenburger Straße 229, 23568 Lübeck, Γερμανία
- 6. Torre Factory**
Torre S.r.l. Via Pian d'Asso, 53024 Torrenieri - Montalcino (SI),
Ιταλία
- 7. Kwizda Agro GmbH** A-2100 Leobendorf, Laaer
Strasse/Kwizda Allee 1, Αυστρία
- 8. Chemark Kft**
Peremarton gyartelep, PO Box 31, 8182, Ουγγαρία
- 9. Nufarm GmbH & Co KG**
St Peter Strasse 25, A-4021, Linz, Αυστρία
- 10.Nufarm S.A.S.** Notre Dame De La Garenne, 27600 Gaillon,
Γαλλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστική ουσία: fluroxypyr (methylheptyl ester) 20% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 69,5% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 12749/305487/26.11.2019 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. πρωτ. 4550/128266/13.05.2022, 4706/122001/25.04.2023 και 7638/197809/08.07.2024 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, για το πανομοιότυπο προϊόν είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες/Δοχεία	500κ.εκ. έως 5L	PET
2	Φιάλες/Δοχεία	500κ.εκ. έως 10L	HDPE, Fluorinated HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους, μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, με ακροφύσια τύπου σκούπας ή με ψεκαστήρα πλάτης για τις ελιές, εσπεριδοειδή.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Το σκεύασμα να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το σκεύασμα είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων (δικοτυλήδονα). Η δραστική ουσία fluoxchryr απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και μετακινείται ταχέως στα υπόλοιπα μέρη των ζιζανίων, προκαλώντας ανάσχεση της αύξησης.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα (max)	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα		
Σίκαλη [SECSS], Βρώμη [AVESA], Κριθάρι [HORVX] (χειμερινό) Σιτάρι [TRZAX] (χειμερινό)	Πλατύφυλλα ζιζάνια [TTTDD]	100	250-670	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται από το στάδιο των 3 φύλλων μέχρι την εμφάνιση του φύλλου σημαίας. (BBCH 13-39)	1

Κριθάρι [HORVX] (ανοιξιάτικο), Σιτάρι [TRZAX] (ανοιξιάτικο)	Πλατύφυλλα ζιζάνια [TTTDD]	75	185- 500	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται από το στάδιο των 3 φύλλων μέχρι την εμφάνιση του φύλλου σημαίας. (BBCH 13-39)	1
Κτηνοτροφικός αραβόσιτος [ZEAMX] Αραβόσιτος [ZEAMX]	Πλατύφυλλα ζιζάνια [TTTDD]	100	250- 670	15-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων . Εφαρμόζεται στο στάδιο από το 3 ^ο έως το 5 ^ο φύλλο. (BBCH 13-15)	1
Λειμώνες αγρωστωδών [3GRLC]	Πλατύφυλλα ζιζάνια [TTTDD]	200	500- 1000	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται από το στάδιο των 3 φύλλων μέχρι την εμφάνιση του πρώτου κόμβου. (BBCH 13-31)	1
Ελιά [OLVEU]	Πλατύφυλλα ζιζάνια [TTTDD]	150	375- 750	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται στο έδαφος χωρίς να διαβρέχονται τα δέντρα.	1
<u>Εσπεριδοειδή</u> Πορτοκαλιά [CIDSi] Λεμονιά [CIDLI] Γκρέιπφρουτ [CIDPA] Λιμμετία (Πράσινα λεμόνια) [CIDAF] Μανταρινιά [CIDRE]	Πλατύφυλλα ζιζάνια [TTTDD]	150	375- 750	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμόζεται στο έδαφος χωρίς να διαβρέχονται τα δέντρα.	1

Παρατηρήσεις:

1. Μην εφαρμόζεται πριν την 1^η Μαρτίου τη χρονιά της καρποφορίας στην ελιά.
2. Μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε καλλιέργειες μη καλά αποστραγγιζόμενες ή εξαιρετικά ξηρές ή εάν τα φύλλα είναι υγρά ή αναμένεται βροχή.
3. Η εφαρμογή του προϊόντος απαγορεύεται σε αλκαλικά εδάφη για όλες τις επιτρεπόμενες καλλιέργειες.
4. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.
5. Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα.

6. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται για εστιακές εφαρμογές σε μόνιμους λειμώνες, σε αμειψισπορά ή σε νέα σπορά λειμώνων αγρωστωδών, η μέγιστη συγκέντρωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 κ.εκ./100 L νερού.
7. Η χρήση στο σιτάρι περιλαμβάνει το σκληρό σιτάρι [TRZDU], την όλυρα [TRZSP] και το τριτικάλε [TTLRI].
8. Η χρήση στην πορτοκαλιά περιλαμβάνει το περγαμόντο [CIDAB] και την νεραντζιά [CIDAU].
9. Η χρήση στο γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει τη φράπα [CIDGR].
10. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει την κιτρολεμονιά [CIDME].

Καταπολεμούμενα ζιζάνια :

Ευαίσθητα ζιζάνια:

Βλήτο *Amaranthus* sp. (AMASS), *Amaranthus albus* (AMAAL), *Amaranthus retroflexus* (AMARE),
 Σινάπι το μέλαν *Brassica nigra* (BRSNI),
 Καλέντουλα *Calendula officinalis* (CLDOF),
 Περικοκλάδα *Convolvulus arvensis* (CONAR),
 Καπνόχορτο *Fumaria officinalis* (FUMOF),
 Αγριοκαρότο *Daucus* sp. (DAUSS),
 Άγρια ρόκα *Diplotaxis erucoides* (DIPER),
 Κολλητσίδα *Galium aparine* (GALAP),
 Ηλιάνθος *Helianthus annuus* (HELAN),
 Αγριομάρουλο *Lactuca serriola* (LACSE),
 Μολόχα *Malva* sp. (MALSS),
 Σολανόν το κίτρινο *Solanum luteum* (SOLLU), Αγριοντοματιά *Solanum nigrum* (SOLNI),
 Πικραλίδα *Picris hieracioides* (PICH),
 Πολυκόμπι *Polygonum aviculare* (POLAV), Αναρριχώμενο πολύγωνο *Polygonum convolvulus* (POLCO),
 Γλιστρίδα *Portulaca oleracea* (POROL),
 Λάπαθο *Rumex crispus* (RUMCR), Μεγάλο λάπαθο *Rumex obtusifolius* (RUMOB),
 Ζωχός *Sonchus* sp. (SONSS),
 Αγριοράδικο *Taraxacum* sp. (TARSS),
 Πεντάνευρο *Plantago lanceolata* (PLALA),
 Αγριοντοματιά *Solanum nigrum* (SOLNI),
 Στελλάρια *Stellaria media* (STEME),
 Ασπράγκαθο *Xanthium spinosum* (XANSP), Αγριομελιτζάνα *Xanthium strumarium* (XANST).

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια

Κίρσιο *Cirsium acaule* (CIIAC),
 Περικοκλάδα *Convolvulus arvensis* (CONAR),
 Ερίγερο *Erigeron* sp. (ERISS),
 Χαμαισική *Euphorbia chamaesyce* (EPHCE),
 Δωδεκάνθι *Lamium amplexicaule* (LAMAM),
 Μαρτιάκος *Senecio vulgaris* (SENVU),
 Περδικούλι *Parietaria judaica* (PAIDI).

6

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- Μην προβαίνετε σε όργωμα του εδάφους έως ότου περάσουν 7 ημέρες από την εφαρμογή.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν ημέρες χωρίς άνεμο, λαμβάνοντας προφυλάξεις για την αποφυγή βλαβών σε γειτονικές καλλιέργειες και για την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης των ψεκασμών.
- Να μην εφαρμόζετε σε δέντρα (ελιές & εσπεριδοειδή) μικρότερα των 4 ετών. Να μη διαβρέχετε τα δέντρα και ειδικότερα τους νεαρούς βλαστούς

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει fluoxycypr, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα Ο κατά HRAC.

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά.

Η επανείσοδος των ζώων στους λειμώνες να γίνεται μετά από 14 ημέρες.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις.

9 Εικονογράμματα κινδύνου/
Προειδοποιητική λέξη:



GHS07



GHS02



GHS08

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΕΥΗ 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Το σκεύασμα περιέχει Petroleum naptha solvent (CAS 64742-95-6).

11

Δηλώσεις
Προφύλαξης:

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P260: Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια.

P210: Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Κατά την εφαρμογή του προϊόντος, ο χειριστής θα πρέπει να αποφεύγει κάθε επαφή με υγρό φύλλωμα.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους, να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

12 Πρώτες βοήθειες –
Αντίδοτο

P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.

P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό.

P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε αφρό, διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή σκόνη, ψεκασμό νερού για την κατάσβεση.

- Απομακρύνετε το άτομο από τον τόπο έκθεσης και αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι, χωρίς τρίψιμο.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή μεταφέρετε το άτομο που έχει υποστεί δηλητηρίαση σε ένα κέντρο υγείας και δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη του προϊόντος.
- Κρατήστε τον ασθενή σε ηρεμία. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος.
- Ελέγξτε την αναπνοή. Αν χρειαστεί, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.
- Εάν το άτομο χάσει τις αισθήσεις του, ξαπλώστε το στο πλάι με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα μισολυγισμένα.
- Αν χρειαστεί, μεταφέρετε το άτομο που έχει υποστεί δηλητηρίαση σε ένα κέντρο υγείας και δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη του προϊόντος.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ.

Συμβουλές προς ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό: Σε περίπτωση κατάποσης, συνιστάται καθαρισμός του πεπτικού συστήματος, ανάλογα με την κατάσταση συνείδησης.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ - ΤΗΛ. 210 7793777. Να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	Ημέρες
Ελιές [επιτραπέζιες (0161030), ελαιοποιήσιμες (0402010)]	120
Σίκαλη (0500070), Βρώμη (0500050), Κριθάρι (0500010), [Σιτάρι, Σκληρό σιτάρι, Όλυρα, Τριτικάλε (0500090)] [Αραβόσιτος Κτηνοτροφικός, Αραβόσιτος (0500030)], Λειμώνες αγρωστωδών, [Γκρέιπφρουτ, Φράπα (0110010)], [Πορτοκάλια, Νεράντζια, Περγαμόντα (0110020)], [Λεμόνια, Κιτρολέμονα (0110030)], Πράσινα λεμόνια (0110040), Μανταρίνια (0110050)	15

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Να αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στην έκθεση αξιολόγησης που στηρίχτηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης του πανομοιότυπου προϊόντος οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

—

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση».
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ